

Recomendaciones de un grupo multidisciplinar de expertos sobre el diagnóstico de pacientes con el virus de la hepatitis delta (VHD) en España

Antecedentes

- El **cribado** de la infección por el virus de la **hepatitis D (VHD)**, un virus que requiere de la coinfección con el virus de la hepatitis B (VHB), es clave para el diagnóstico precoz de la infección, permitiendo mejorar el pronóstico de las personas infectadas mediante una estrategia que ha demostrado ser efectiva y eficiente.

Objetivo

- El artículo revisa la epidemiología y la situación actual de la hepatitis D en España, así como las principales barreras para su detección y diagnóstico, con el objetivo final de definir unas recomendaciones para la detección y el diagnóstico de infección por VHD, determinadas por expertos de ámbito multidisciplinar.

Resultados y repercusión

- En relación con el cribado, se establecen recomendaciones sobre: 1) entornos y poblaciones con indicaciones de cribado; 2) optimización de la detección del VHD; y 3) periodicidad con la que debe repetirse la prueba.
- En relación con el diagnóstico, se abordan aspectos sobre: 1) cómo diagnosticar la infección por VHD (doble test reflejo); 2) qué características presentan las pruebas disponibles actualmente para determinar el ARN-VHD, y 3) posibles soluciones para superar las barreras actuales en el diagnóstico de la infección.
- Además de contribuir a mejorar el pronóstico de la hepatitis D, estas recomendaciones representan un avance hacia la eliminación de las hepatitis virales en 2030, objetivo de la Organización Mundial de la Salud.

